

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto Adempimenti TRACES-UVAC	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

Allegato 2

Per la profilassi antirabbica pre-contagio del cane e del gatto in Italia sono disponibili 4 vaccini, tutti inattivati: Nobivac Rabbia (*Intervet*), Rabigen Mono (*Virbac*), Rabisin (*Merial*) e Vanguard R (*Pfizer*) (tabella 1)

Tabella 1 : I vaccini antirabbici ad uso veterinario in commercio in Italia

	Nobivac Rabbia	Rabigen Mono	Rabisin	Vanguard R
ditta	<i>Intervet</i>	<i>Virbac</i>	<i>Merial</i>	<i>Pfizer</i>
tipo di vaccino	inattivato	inattivato	inattivato	inattivato
Ceppo	Pasteur/RIV	VP12	GS 57Wistar	SAD Vnukovo-32
coltivazione su	linea cellulare BHK-21	cellule renali di criceto	cellule embrionali di criceto	linea cellulare BHK-21
adjuvante	fosfato di alluminio	idrossido di alluminio	idrossido di alluminio	idrossido di alluminio
specie di destinazione	cani, gatti, volpi, furetti	cani, gatti	cani, gatti, bovini, ovini, cavalli	cani, gatti, bovini, suini, ovicapriini, cavalli, furetti
somministrazione	SC, IM	SC, IM	SC, IM	SC, IM
età della 1ª vaccinazione	3 mesi *	3 mesi	3 mesi	3 mesi
richiamo dopo	3 anni	1 anno	1 anno	1 anno per il 1°, poi 2 anni per i successivi

*Il vaccino Nobivac Rabbia della Intervet può essere utilizzato anche in cani, gatti e furetti di un'età inferiore ai 3 mesi: in questo caso, però, è necessario un richiamo vaccinale al compimento dei 3 o dei 6 mesi di età a seconda della specie.

L'immunizzazione di base prevede per tutti una prima vaccinazione in cuccioli e gattini che hanno superato i 3 mesi di età e un richiamo a un intervallo di tempo diverso a seconda del vaccino (1 anno per Rabigen Mono e Rabisin, 2 anni per Vanguard R e 3 anni per Nobivac Rabbia). Si ricorda che la validità della vaccinazione antirabbica deve essere riferita proprio alle indicazioni riportate dalla ditta produttrice in relazione al tipo di vaccino utilizzato (nota ministeriale prot. n. 3409 del 26.01.2006).

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto Adempimenti TRACES-UVAC	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

Tabella 2: Vaccini registrati in Europa con uso consentito prima dei 3 mesi di età

vaccino	ditta	età minima della 1a vaccinazione	nazione
Dohyrab	Fort Dodge	7 settimane	Belgio
Nobivac Rabies	Intervet	8-12 settimane	Austria
		< 3 mesi	Belgio
		< 3 mesi	Ungheria
		4 settimane (madri non vaccinate)	Irlanda
		< 3 mesi	Italia
		Rabisin	Merial
Rabisin	Merial	4 settimane (madri non vaccinate)	Belgio
		4 settimane (madri non vaccinate)	Danimarca
		4 settimane (madri non vaccinate)	Finlandia
		4 settimane (madri non vaccinate)	Polonia
		11 settimane	Repubblica Ceca
		11 settimane	Repubblica Slovacca
		11 settimane	Ungheria
Rabdomun	Schering Plough	7 settimane	Belgio
		< 12 settimane	Portogallo
		4 settimane (madri non vaccinate)	Finlandia
		7 settimane	Repubblica Ceca
Vaccidog R	Ceva Phylaxia Zrt	< 3 mesi	Ungheria
Biocan R	Bioveta	< 3 mesi	Polonia
Vacina antirabica	Lab. Serologico Productos Veterinarios	< 12 settimane	Portogallo
Dog Vac Rabia	Veterinaria	< 12 settimane	Portogallo
Rabigen Mono	Virbac	< 12 settimane	Polonia
Canvar R	Dyntec	4 settimane	Repubblica Ceca
		(madri non vaccinate)	
Rabvac 3	Fort Dodge	< 3 mesi	Repubblica Slovacca
Rabicell	Mevak	8 settimane	Repubblica Slovacca